

La combinación perfecta!



INIX

SC

- **Fungicida sistémico**
- **Preventivo y curativo**
- **Amplo espectro de control**
- **Compatible con la mayoría de los agroquímicos, abonos foliares y aceites agrícolas**

Recomendado especialmente en la fase de desarrollo vegetativo del cultivo, en variedades muy sensibles a las enfermedades de follaje y cuando haya alta presión de la enfermedad



La combinación perfecta para lograr máxima protección y control de enfermedades fungosas en sus cultivos



ONIX SC puede ser aplicado en agua, emulsiones de aceite y agua o aceite agrícola solamente, ofreciendo esta última mejor control con intervalos más largos.

| CULTIVO | | PLAGA | | DOSIS |
|------------------|-----------------------|--|---|---------|
| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTÍFICO | L/HA |
| Arroz | Oriza sativa | Piricularia Mancha lineal Añublo de la vaina de la hoja Mancha circular | Pyricularia orizae Cercospora orizae Rizoctonia solani Helminthosporium orysae | 0,5-1 |
| Banano y Platano | Musa spp | Sigatoca negra | Mycosphaerella fijensis | 0.5-1 |
| Maíz | Zea mays | Rhizoctonia | Rizoctonia solana | 0.8-1 |
| Cafe | Coffea arabica | Roya Ojo de gallo Antracnosis | Hemilea vastatrix Mycena citricolor Colletotrichum spp | 0.8-1,4 |

RECOMENDACIONES

Arroz: Aplique al observar los primeros síntomas. Se recomienda repetir el tratamiento a los 15 o 20 días después de la primera aplicación.

Plátano y Banano: Comience el tratamiento al inicio de las lluvias, dejando un intervalo de 15 a 20 días entre las aplicaciones de acuerdo a la presión de la enfermedad. Se pueden efectuar una o dos aplicaciones de ONIX SC seguidas de tres con otros fungicidas de diferente modo de acción y finalizar con una de ONIX SC. Otra forma de tratamiento es al comienzo de lluvias (1-2 aplicaciones), rotando con otro fungicida (1 aplicación). Finalmente 2 aplicaciones de ONIX SC y rotar con otro fungicida. Entre las aplicaciones de ONIX SC debe haber entre 7 y 12 días. Y otro fungicida debe haber entre 7 y 12 días.

Maíz: Aplique al observar los primeros síntomas. Dependiendo de la severidad del ataque y de las condiciones ambientales favorables al desarrollo de la enfermedad, se recomienda aplicar o repetir entre 25 y 35 días después de la germinación, antes que el maíz cierre.

DISTRIBUIDO POR:

