



Zarzal 16SL

**Herbicida selectivo
para el control
de malezas de
hoja ancha**



¿QUE ES EL ZARZAL 16SL?

Es un herbicida sistémico y selectivo a los pastos, para el control de malezas de hoja ancha herbáceas, arbustivas o leñosas, en tratamientos generales, localizados (parchoneo) o a los tocones.

Es producto de la mezcla de dos herbicidas: el Picloram y el 2, 4 D.

¿CÓMO ACTÚA?

Es absorbido rápidamente por las hojas y raíces y traslocado a través del floema y xilema hasta los nuevos brotes, donde se acumula.

Actúa alterando la síntesis de los ácidos nucleicos y proteínas. En los tejidos meristemáticos actúa como inhibidor del crecimiento, ocasiona elongación celular, malformaciones, ruptura de los tejidos y epinastia.

CUANDO APLICAR VIGILANT 16 SL

La aplicación debe efectuarse preferiblemente cuando las malezas tengan entre 3 a 4 hojas verdaderas y estén vigorosas y en activo crecimiento.

Se debe evitar su uso en terrenos inundados o en áreas con prolongada sequía, así como malezas con poco follaje, agotadas o estresadas o cuando se encuentren con abundante floración o fructificación.

DOSIS A EMPLEAR

CULTIVO	DOSIS l/ha
Pastos	Aplicar de 2.0 a 8.0 a litros en 200 a 400 litros de agua para aplicaciones terrestres cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas verdaderas.
	Para especies resistentes asperje una dosis de 4.0 a 8.0 a litros en 200 a 400 litros de agua para aplicaciones terrestres cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas verdaderas.

MALEZAS QUE CONTROLA

Viborana Asclepias curassavica
Frijolillo Cassia tora
Camaroncillo Blechum pyramidatum
Cinquillo Drymaria cordata
Dormilona Mimosa pudica
Bledo Amaranthus sp
Churristate Ipomoea sp
Cinco negritos Lantana camara
Cornisuelo Acacia cornigera
Churrite Hyptis capitata
Uva cimarrona Ciccus sicyodes
Clavito Ludwigia decurrens
Turte Vernonia patens
Zarza Mimosa pigra

EN QUE CONDICIONES SE PUEDE APLICAR?

A) Aplicación foliar total o general

Consiste en efectuar el tratamiento en todo el potrero, cuando la infestación por las malezas es de más de un 50%.

Equipo a emplear: aéreo, terrestre (acoplado al tractor o bomba de espalda).

B) Aplicación foliar localizada o parchoneo

En este caso, el herbicida se aplica solo en aquellas áreas del potrero infestadas por las malezas.

Equipo a emplear: equipo de tractor o bomba de espalda.

C) Aplicación al tocón

Esta práctica se emplea cuando se requiere controlar malezas arbustivas o leñosas, cerosas o con mucha raíz. Consiste en cortar la planta lo más cerca posible del suelo y aplicar directamente sobre el tocón o alrededor del tallo, sobre los cortes recientes.

Equipo a emplear: brocha o bomba de espalda.

ASPECTOS A TENER PRESENTES

- Debe mezclarse únicamente con agua limpia.
- Evite la aplicación directa o la deriva hacia cultivos y plantas sensibles al producto.
- Calibre siempre su equipo de aplicación y use las dosis recomendadas.
- Aplique sobre malezas que estén creciendo vigorosamente.
- Mantenga el ganado fuera de las áreas tratadas durante un mínimo de 10 días después de la aplicación.

DISTRIBUIDO POR:

